



**TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL**

**1. (Concurso Aurora/2018) As manchas de fluorose podem ser diferenciadas das manchas causadas por cárie se algumas características forem observadas. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da mancha de fluorose**

- A) Mancha em forma de meia-lua, não simétrica.
- B) Assimetria das lesões.
- C) Manchas branco-giz na ponta de cúspides.
- D) Manchas brancas presentes em dentes homólogos.
- E) Disposição horizontal das linhas brancas.

**2. (Concurso Aurora/2018) São atribuições conferidas ao THD, segundo a resolução CFO-185-93**

- A) Realizar a escultura de restaurações de amálgama
- B) Colaborar nos programas educativos de saúde bucal
- C) Receitar medicamentos de uso controlado
- D) Realizar preparos cavitários
- E) Realiza a remoção de cálculo subgengival

**3. (Concurso Aurora/2018) Hepatites, AIDS, difterias, rubéola, sarampo, influenza (gripe), caxumba (parotidite), e tuberculose são doenças passíveis de serem contraídas pelos integrantes da equipe odontológica na sua prática profissional. Entre essas doenças, a hepatite B, frequentemente associada ao câncer hepático, merece destaque especial, por ser a doença ocupacional infecciosa mais frequente em equipe odontológica. Com relação ao assunto, assinale a alternativa que contém medidas que são relevantes para a proteção desses profissionais**

- A) O uso de barreiras é um dos equipamentos de proteção individual
- B) Luvas, máscaras, óculos, aventais, gorros e películas
- C) Evitar contato direto com matéria orgânica e limitar a propagação de microorganismos
- D) Proteger a saúde da equipe e cuidar no uso de artigos, peças e superfícies
- E) As imunizações e a adoção de controle de infecção

**4. (Concurso Aurora/2018) Quanto à raspagem e alisamento e ao alisamento radicular em periodontia, é correto afirmar:**

- A) Raspagem e alisamento radicular são procedimentos separados
- B) Enxadas e limas não são capazes de produzir uma superfície radicular lisa como as curetas
- C) O cálculo supragengival geralmente é mais duro que o subgengival, tornando-o mais retentivo e difícil de remover
- D) Prender um pedaço de cálculo em toda a extensão da borda cortante da cureta é recomendado para remover mais facilmente o mesmo
- E) A remoção de grandes depósitos de dentina e cimento é necessária para deixar as raízes livres de toxinas

**5. (Concurso Aurora/2018) Sobre a raspagem, alisamento e polimento dentário, é incorreto afirmar:**

- A) O polimento coronário e a aplicação de flúor complementam a terapia periodontal de descontaminação dentária
- B) Para o alisamento radicular dentário, a intensidade da força de manuseio da cureta de Gracey é mais branda e a amplitude do movimento é menor do que o da raspagem
- C) O procedimento de raspagem e alisamento dental inicia-se pela avaliação da topografia da área a ser instrumentada através da sondagem periodontal para a avaliação da profundidade clínica de sondagem e do nível de inserção periodontal



- D) Ao instrumentar um elemento dental o profissional deve delimitar a região a ser trabalhada, estabelecendo pequenas faixas ou zonas de instrumentação que serão atingidas ao longo da raspagem e do alisamento radicular dentário
- E) A cureta McCall 17/18 é um raspador manual utilizado para raspagem e alisamento dental, indicado para todas as faces dos dentes posteriores
- 6. (Concurso Aurora/2018) Os raios-X são de extrema importância na clínica odontológica, porém seu uso deve ser cercado de cuidados para proteger a saúde do profissional e do paciente. Assinale a alternativa incorreta sobre os cuidados de biossegurança com raios-X na prática odontológica:**
- A) Deve haver sinalização de radiação no local de uso dos aparelhos
- B) Para cada equipamento de raio-X deve haver uma vestimenta plumbífera
- C) O botão disparador de raios-X deve dificultar disparos acidentais
- D) A emissão de raios-X, durante sua exposição, não deve emitir sinal sonoro de alerta
- E) A sala onde foi instalado o equipamento de radiografia intraoral deve permitir que os profissionais fiquem a pelo menos 2 metros do cabeçote, quando do seu uso.
- 7. (Concurso Aurora/2018) A radiografia periapical é a técnica radiográfica intrabucal indicada para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte. A principal característica dessa técnica é a riqueza de detalhe da imagem radiográfica. Sobre a radiografia periapical, é incorreto afirmar que:**
- A) Na técnica periapical do paralelismo, a imagem do processo zigomático da maxila é projetada acima dos ápices dos molares superiores
- B) Os dentes a serem avaliados e o receptor de imagem (filme) devem estar em contato ou o mais próximo possível
- C) A técnica periapical da bisettriz não deve ser utilizada para a análise de coroas e cristas ósseas alveolares
- D) A anatomia da cavidade bucal não interfere na realização da técnica periapical do paralelismo
- E) Na radiografia periapical para região de molares superiores é possível se visualizar o processo coronóide da mandíbula e o processo zigomático da maxila
- 8. (Concurso Aurora/2018) Com relação ao polimento de restaurações de amálgama é correto afirmar que:**
- A) Na técnica das pastas abrasivas, a pasta de Branco de Espanha vem antes da pasta de pedra-pomes
- B) Está em desuso, pois causa enfraquecimento da restauração
- C) O uso de instrumentos rotatórios multilaminados deve ser evitado nas vertentes das cúspides
- D) Só deve ser realizado uma semana após a finalização da restauração
- E) O superaquecimento causado pelo emprego inadequado das taças de borracha pode causar aflorecimento de mercúrio
- 9. (Concurso Aurora/2018) De maneira geral, a condensação de ligas de amálgama com partículas usinadas em cavidades classe II deve ser iniciada pela caixa:**
- A) Oclusal, com condensadores de pequeno diâmetro.
- B) Oclusal, com condensadores de grande diâmetro
- C) Proximal, com condensadores de pequeno diâmetro.
- D) Proximal, com condensadores de grande diâmetro.
- E) Proximal, com porta-amálgama.



**10. (Concurso Aurora/2018) Com relação às barreiras mecânicas utilizadas no atendimento odontológico, assinale “V” para as sentenças verdadeiras e “F” para as falsas.**

- ( ) O paciente não precisa usar óculos de proteção
  - ( ) A máscara deve ser trocada sempre que estiver úmida
  - ( ) O filme de PVC para cobrir equipamentos deve ser trocado a cada semana
  - ( ) A máscara deve ser trocada a cada paciente
  - ( ) A equipe deve usar óculos durante o atendimento e a lavagem do instrumental
  - ( ) A máscara deve ser trocada diariamente
- A sequência correta, de cima para baixo, é:**

- A) V, F, V, V, V, F
- B) F, F, F, F, V, V
- C) F, V, F, V, V, F
- D) V, F, V, F, F, V
- E) V, V, V, V, V, V

**11. (Concurso Aurora/2018) Durante o exame clínico, o Cirurgião-dentista ditou: cárie na face mesial do dente 25 e cárie na face distal do dente 12. Ele está se referindo, respectivamente, aos dentes:**

- A) primeiro pré-molar superior direito e incisivo lateral superior esquerdo;
- B) primeiro pré-molar superior esquerdo e incisivo lateral inferior esquerdo;
- C) segundo pré-molar inferior esquerdo e incisivo lateral inferior direito;
- D) segundo pré-molar superior esquerdo e incisivo lateral superior direito;
- E) segundo pré-molar inferior esquerdo e incisivo lateral superior direito

**12. (Concurso Aurora/2018) O teste de vitalidade é um importante meio de diagnóstico das afecções da polpa dentária. A alternativa que corresponde ao teste de vitalidade pulpar *MENOS* utilizado, sendo indicado apenas**

**quando não for possível fechar o diagnóstico através dos demais testes:**

- A) de cavidade
- B) elétrico
- C) de mordida
- D) percussão
- E) de palpação

**13. (Concurso Aurora/2018) Com relação ao descarte dos resíduos odontológicos, marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.**

- ( ) O instrumental perfuro cortante deve ser descartado em embalagens especiais e resistentes.
- ( ) Os resíduos de amálgama de prata devem ser acondicionados em recipiente com tampa.
- ( ) O instrumental perfuro cortante descartável deve ser jogado em sacos duplos.
- ( ) Alguns produtos químicos de uso odontológico, como os reveladores e fixadores, devem ser descartados na mesma pia onde é feita a lavagem dos instrumentais.

**A sequência correta, de cima para baixo, é:**

- A) V, V, F, F;
- B) F, F, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) F, F, V, V;
- E) F, V, F, V.

**14. (Concurso Aurora/2018) A parte do prontuário odontológico que compreende o quadro clínico geral e odontológico do paciente é denominada de**

- A) Odontograma
- B) Anamnese
- C) Plano de tratamento
- D) Qualificação do paciente
- E) Histórico de atendimento



**15. (Concurso Aurora/2018) Durante um procedimento de raspagem supra-gengival, o Técnico em Higiene Dental (THD) sofre um acidente de trabalho com instrumental perfuro-cortante econtamina a mão. Que protocolo deve ser seguido imediatamente?**

- A) Lavar as mãos sem remover as luvas para evitar maior contaminação, procurar o serviço de saúde para realização de exames de sangue
- B) Passar álcool 70% nas luvas, removê-las e procurar o serviço de saúde até o dia seguinte após o acidente
- C) Remover as luvas, lavar com água e sabão, procurar o mais breve possível o serviço de saúde indicado juntamente com o paciente fonte para realização de exames imediatos e indicações da conduta a ser seguida
- D) Remover as luvas, lavar com água e sabão, iniciar tratamento com antibióticos imediatamente
- E) Remover as luvas, lavar imediatamente com solução de hipoclorito de sódio, procurar o serviço de saúde mais próximo

**16. (Concurso Aurora/2018) Segundo os conceitos de ergonomia em Odontologia, no que diz respeito às áreas de trabalho e posturas e posições da equipe odontológica, é verdadeiro:**

- A) Os instrumentais a serem utilizados durante o atendimento devem estar ao alcance mínimo do CD e ASB, dentro do círculo com diâmetro de 2 metros.
- B) O círculo central A tem diâmetro de 1 metro e é o espaço ideal de pega.
- C) A posição de 7 horas não é bem utilizada, por dificultar a visão tanto da maxila quanto da mandíbula.
- D) As gavetas abertas e equipo devem estar localizados no espaço máximo de pega de 2 metros de diâmetro.
- E) A posição de 12 horas não é ideal para a visão da mandíbula.

**17. (Concurso Aurora/2018) A técnica de inserção por “incremento” nas cavidades dentárias é utilizada para compensar a contração de polimerização de qual material restaurador?**

- A) Selante
- B) Amálgama
- C) Cimento de ionômero de vidro
- D) Resinas compostas fotoativadas
- E) Resinas acrílicas ativadas quimicamente

**18. (Concurso Aurora/2018) As concentrações para os bochechos com flúor de uso semanal e diário são, respectivamente:**

- A) 0,02% e 0,005%
- B) 0,2% e 0,05%
- C) 0,005% e 0,02%
- D) 0,5% e 0,2%
- E) 0,2% e 0,5%

**19. (Concurso Aurora/2018) Muitos métodos para escovação dos dentes são descritos e promovidos como sendo eficientes e efetivos. Esses métodos podem ser categorizados primariamente de acordo com o desenho do movimento, quando da escovação. Qual técnica de escovação corresponde ao desenho do movimento realizado?**

- A) Técnica de Bass (movimento de rolo)
- B) Técnica Fones (movimento vibratório)
- C) Técnica de Leonard (movimento vertical)
- D) Técnica de Stilmann (movimento circular)
- E) Técnica de Charters (movimento horizontal)



**20. (Concurso Aurora/2018) A técnica de compressão abdominal subdiafragmática que pode ser utilizada se houver obstrução total aguda das vias aéreas por corpos estranhos no consultório odontológico (material de moldagem, fragmento de restaurações, limas endodônticas, brocas e/ou componentes de implantes) é denominada de:**

- A) Posição de Trendelenburg
- B) Manobra de ressucitação cárdio-pulmonar
- C) Correção da alcalose respiratória
- D) Manobra de Heimlich
- E) Síncope