



CIRURGIÃO DENTISTA ORAL MENOR

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A periodontite crônica é uma doença lentamente progressiva, associada a fatores locais ambientais bem conhecidos. De acordo com seu prognóstico analise os itens abaixo:

1. Em casos nos quais a perda de inserção clínica e perda óssea não são muito avançadas (periodontite leve a moderada), o prognóstico geralmente é bom, contanto que a inflamação possa ser controlada através de uma boa higiene oral e da remoção dos fatores locais e retentivos de biofilme.
2. Em pacientes com periodontite grave, como evidenciado pelo envolvimento avançado de furca e pela mobilidade clínica aumentada, ou em pacientes que não aderem às práticas de higiene oral, o prognóstico pode ser baixado para desfavorável.
3. Pacientes diabéticos, mesmo que compensados, apresentam prognóstico bastante ruim se a periodontite for leve.
4. Pacientes com gengivite associada apenas ao biofilme dental apresentam prognóstico não muito favorável.

Marque a alternativa que apresenta os itens corretos:

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 3, 4
- C) 1, 2, 4
- D) 2, 3, 4

E) 1 e 2

22. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia o enunciado da questão:

O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. Os artigos são classificados em críticos, semicríticos e não-críticos.

Correlacione as colunas de acordo com a classificação dos instrumentais utilizado na odontologia.

- A. Artigo crítico
- B. Artigo não-crítico
- C. Artigo semi-crítico

- () Cureta McCall 11-12
- () Sonda OMS
- () Espelho para Fotografias extra-bucal
- () Óculos de proteção
- () Jaleco
- () Afastador bucal

- A) A;B;B;C;C;B
- B) B;B;A;A;C;C
- C) B;A;C;B;C;B
- D) A;A;C;B;B;C
- E) C;C;A;B;B;B

23. (CONCURSO MAURITI/2018)

Leia o texto abaixo e responda o que se pede:

Quanto mais os dentistas entenderem as variáveis clínicas e os substratos que podem influenciar a formação de uma camada híbrida efetiva, maior



probabilidade terão de criar adesões resina\dente duradoura. O principal objetivo na adesão ao esmalte\dentina\cimento é a hibridização da estrutura dentaria desmineralizada e a consequente interação dos sistemas adesivos.

Sobre o passo a passo da técnica de uma restauração em resina compostas, marque a alternativa falsa.

- A) O processo de adesão a dentina é um desafio por ser um substrato dinâmico com inúmeras diferenças estruturais e variáveis (composição, fluidos dentinários, gradientes de pressão, variações de permeabilidade, comprimento e diâmetro dos túbulos, graus de calcificação, etc).
- B) Quando um material resinoso é aplicado na superfície do esmalte, condicionada com ácido, os monômeros são levados para dentro das irregularidades por atração capilar, estabelecendo assim, a adesão. O fluxo de penetração dos adesivos nas áreas porosas resulta na formação de "tags" de resina que se unem mecanicamente a resina composta e ao esmalte previamente condicionado.
- C) A secagem excessiva da dentina após o condicionamento poderá acarretar a desidratação das fibras colágenas pela precipitação de proteínas provocando o colapso das mesmas e a consequente formação de espaços vazios, pois o sistema adesivo não conseguirá penetrar.
- D) A *smear layer* oclui os túbulos dentinários e aumento a permeabilidade da dentina em 86%. A camada residual de dentina contém cristais de hidroxiapatita e bactérias.
- E) Um aspecto negativo *smear layer* é a sensibilidade pós-operatória e prevenção da penetração bacteriana nos túbulos dentinários, por ser permeável aos produtos bacterianos, que podem resultar em resposta inflamatória do tecido pulpar.

24. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto à terapêutica medicamentosa para prevenção da endocardite infecciosa em pacientes portadores de válvulas cardíacas protéticas e que são alérgicos aos betalactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), a alternativa correta é:

- A) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 dia antes do tratamento;
- B) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 hora antes do tratamento;
- C) Amoxicilina oral 2g iniciada 1 hora antes do tratamento;
- D) Amoxicilina oral 500mg iniciada 1 hora antes do tratamento;
- E) Cefalexina oral 500 mg iniciada 1 hora antes do tratamento.

25. (CONCURSO MAURITI/2018) O diagnóstico Endodôntico é fruto de uma série de informações isoladas, advindas do confronto da queixa principal do paciente com testes clínicos pulpares, perirradiculares, sondagem periodontal e exame radiográfico, além de outros testes complementares.

Sobre o diagnóstico pulpar indique quais as características abaixo se referem a que



patologia pulpar descrita pelos números há seguir:

- 1 - Pulpite reversível
 - 2 - Pulpite irreversível assintomática
 - 3 - Pulpite irreversível sintomática
 - 4 - Necrose pulpar
- () Resposta a testes térmicos negativo em decorrência do canal estar calcificado, onde o aspecto radiográfico apresentam espessamento do espaço do ligamento periodontal, podendo ser identificadas as chamadas lesões perirradiculares.
- () As características desta entidade patológica pode incluir dor aguda após estímulo térmico (demorando a cessar após a remoção do estímulo), dor espontânea (dor não provocada) e dor irradiada (dor reflexa). A resposta á palpação apical e percussão vertical pode ser negativa ou positiva, e o aspecto radiográfico pode se apresentar normal ou ligeiro espessamento do ligamento periodontal.
- () Muitas vezes não há neste caso uma queixa clínica dolorosa importante. Costumam responder normalmente ou de forma bastante moderada aos testes térmicos, podendo ter sofrido agressão ou cárie profunda, cuja remoção leva á exposição da polpa. Quando existe dor costuma ser intermitente (não continua), sobretudo por compressão.
- () Responde positivo para testes térmicos e elétricos, reagindo aos estímulos com resposta dolorosa de intensidade compatível com a excitação provocada. A palpação apical e percussão resulta em resposta negativa.

Assinale a alternativa que indica a sequencia correta:

- A) 4; 2; 3; 1
B) 4; 3; 2; 1
C) 3; 2; 4; 1
D) 3; 1; 4; 2
E) 2; 1; 4; 3

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Os dentes decíduos ou permanentes, para alcançar sua maturidade morfológica ou funcional, passam por um ciclo vital característico bem definido, composta por diversas fases. Durante essas fases do desenvolvimento dentário, podem ocorrer anomalias relacionadas com diversas etiologias, gerando situações que terão importâncias clínicas.

De acordo com o texto, correlacione a coluna 1 com a 2, relatando a sua definição de cada alteração de desenvolvimento, marcando o item que melhor representa.

- 1- Geminação
- 2- Fusão
- 3- Concrecência

- () União entre dois germes independentes.
- () Uma fusão produzida após o início da formação radicular, nessa anomalias os dentes unem-se apenas pelo cimento.
- () Tentativa de divisão de um germe dentário simples por invaginação, fenômeno esse que ocorre durante o estágio de proliferação do ciclo vital dos dentes.



- A) 1;2;3
- B) 2;1;3
- C) 2; 3;1
- D) 3;2;1
- E) 3;1;2

27. (CONCURSO MAURITI/2018) O líquen plano oral, é uma inflamação crônica do revestimento interior da boca que provoca o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas muito dolorosas, sendo semelhantes a aftas. Quando surgem manchas na boca e existem suspeitas de líquen plano é aconselhado consultar um dentista para avaliar a possibilidade de ser outro problema. Qual das alternativas não apresentam características e sintomas mais comuns do líquen plano oral:

- A) Manchas esbranquiçadas na boca
- B) Sensação de queimação na boca
- C) Manchas inchadas, vermelhas e dolorosas
- D) Sensibilidade excessiva para comida quente, ácida ou picante
- E) Inflamação periodontal

28. (CONCURSO MAURITI/2018) A importância em conhecer as diferenças anatômicas e fisiológicas entre a criança e o adulto, tem o intuito de estabelecer um padrão de procedimento seguro no uso dos anestésicos locais, incluindo a compreensão suas classificações quanto a

estrutura química e a duração de ação cada um.

De acordo com a estrutura química assinale a alternativa que contenha apenas anestésicos locais do tipo éster.

- A) Benzocaína, mepivacaína, lidocaína e cloroprocaína.
- B) Articaína, benzocaína e bupivacaína.
- C) Articaína, lidocaína, procaína e tetracaína.
- D) Lidocaína, tetracaína, bupivacaína e cloroprocaína.
- E) Benzocaína, procaína, tetracaína e cloroprocaína.

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Assim foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. O SUS, em conjunto com as demais políticas, deve atuar na promoção da saúde, prevenção de ocorrência de agravos e recuperação dos doentes. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios.

Leia abaixo um dos princípios o qual rege o SUS e assinale o item a qual o representa.

'O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços,



as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.'

- A) Integralidade
- B) Universalidade
- C) Equidade
- D) Participação popular
- E) Regionalização

30. CONCURSO MAURITI /2018) Paciente A.M.A, sexo feminino, 14 anos de idade, compareceu ao atendimento de urgência odontológica relatando traumatismo dentário no elemento 11. Na anamnese a paciente relatou que brincava com uma colega e que bate a cabeça no cotovelo dela. Ao exame clínico observou uma redução do nível de exposição da coroa de aproximadamente 2mm em relação ao dente homólogo, além da gengiva marginal edemaciada com pequeno sangramento no sulco gengival. Ao exame radiográfico observamos a rizogênese completa do forame, além de não encontrar danos no periodonto. Qual o diagnóstico e tratamento do dente 11 analisando os aspectos listados acima, assinale a alternativa a qual descreve respectivamente:

- A) Luxação Lateral e Proservação
- B) Luxação Extrusiva e Reimplante dentário
- C) Concussão e Tratamento endodôntico
- D) Luxação Intrusiva e Tracionamento ortodôntico
- E) Avulsão e Contenção rígida

31) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre os acidentes e complicações em anestesia local, marque a opção correta:

- A) A estomatite aftosa recorrente ou herpes simples, podem ocorrer intraoralmente após uma injeção de anestésico local ou após qualquer trauma aos tecidos intraorais
- B) A sonolência excessiva tem relação com o metabolito glicinoxilidida presente na procaina
- C) O hematoma facial pode ser decorrente da lesão pela agulha no plexo arterial pterigóide
- D) A quebra da agulha ocorre de forma mais prevalente nas agulhas longas
- E) A anestesia acidental do nervo facial pode levar a uma dificuldade de elevar as pálpebras superiores

32) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre as Soluções Anestésicas, marque a alternativa correta.

- A) O bissulfito de sódio é usado em uma concentração de 0,5% e 1%
- B) Solução de lidocaína a 2% com pH de 6,8 é acidificada a 4,2 pela adição de bissulfito
- C) O metilparabeno é utilizado em concentração 1% com ação bacteriostática
- D) O cloreto de sódio é adicionado para tornar a solução mais alcalina
- E) A porção iônica da solução é lipossolúvel

33) (CONCURSO MAURITI/2018) O trauma em qualquer nervo pode levar a parestesia, inclusive pela própria agulha



anestésica nos procedimentos cirúrgicos orais. Mas independente do trauma, a própria solução pode ocasionar essa complicação. Qual a solução anestésica que de forma mais prevalente pode ocasionar parestesia nervosa por tempo prolongado?

- A) Articaína
- B) Bupivacaína
- C) Adrenalina
- D) Lidocaína
- E) Mepivacaína

34) (CONCURSO MAURITI/2018) A descamação epitelial, como necrose em mucosas pode estar relacionado a anestesia odontológica, e pode ter etiologia na(o);

- A) aplicação de um anestésico tópico nos tecidos gengivais por um período prolongado
- B) penetração da agulha longa para anestesia regional
- C) caso de anestesia subperiosteal
- D) Localização anatômica do túber da maxila
- E) Vasoconstrictor felipressina com maior prevalência

35) (CONCURSO MAURITI/2018) Na abordagem do trauma, a avaliação inicial é importante na identificação de lesões

graves, portanto na avaliação das funções dos pares cranianos podemos encontrar:

- A) Alterações de acuidade visual pode ser encontrada em lesões do II e V par craniano
- B) Alterações na abertura palpebral pode ser encontrada em lesão do III para craniano
- C) Alteração na abertura bucal por ser encontrada em lesão do VII para craniano
- D) Amaurose pode ser encontrada na lesão do I (primeiro) para craniano
- E) Anosmia pode ser encontrada na lesão do III para craniano

36) (CONCURSO MAURITI/2018) Nas fraturas faciais o reestabelecimento dos pilares de resistência são fundamentais, então para o suporte vertical temos;

- A) nasomaxilar, zigomático e pterigomaxilar.
- B) Condilar, Zigomático, Canino
- C) Frontonasal, canino, ângulo mandibular
- D) Linha Obliqua, canino, pterigomandibular
- E) Frontozigomatico, frontomaxilar, condilar

37) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o tratamento das fraturas faciais, a utilização da fixação interna funcionalmente estável com placas e parafusos tem sido amplamente empregada, em detrimento das fixações com fio de aço. Sobre as duas abordagens



(Fio x Placa) assinale a alternativa correta;

- A) Após a redução fechada da fratura do corpo da mandíbula e a colocação dos componentes dentários ou do processo alveolar em relação adequada com a maxila, a necessidade de uma redução aberta deve ser determinada. Se ocorrer uma correta redução óssea, a fixação maxilomandibular permitirá uma estabilização adequada durante a fase inicial de cicatrização óssea, de aproximadamente 6 semanas.
- B) Em alguns casos, não é necessário obter uma redução anatômica ideal no tratamento conservador das fraturas condilares. Neste tipo de fratura, o deslocamento mínimo ou moderado do segmento condilar geralmente resulta em adequadas função e oclusão pós-operatórias. Nesses casos, a fixação e imobilização intermaxilar constante é usada pelo tempo máximo de 6 a 8 semanas para adultos e de 30 a 45 dias para crianças, seguido de um período de reabilitação funcional intensivo
- C) Quando a redução aberta é realizada, deve ser obtido um acesso cirúrgico direto à área fraturada. Este acesso pode ser conseguido por meio de diversas abordagens cirúrgicas, dependendo da área da mandíbula fraturada. Ambas abordagens, intra e extra-orais são possíveis. Geralmente, a sínfise e a região anterior da mandíbula podem ser facilmente acessadas através de uma incisão extra-oral que sempre devem ser optadas pela possibilidade de visualização da redução.
- D) O método tradicional e ainda aceitável de estabilização óssea após a redução aberta tem sido a osteossíntese com fio de aço combinada com um período de fixação intermaxilar que dura 12 semanas. Este

método de fixação pode ser realizado por meio de variadas técnicas de fio de aço e, em geral, é suficiente para manter os segmentos ósseos em suas posições corretas durante o tempo de consolidação da fratura.

- E) Atualmente, as técnicas de fixação interna rígida têm sido amplamente usadas para o tratamento de fraturas. Estes métodos utilizam placas ou parafusos ósseos, ou ambos, para uma fixação mais rígida e estabilização dos segmentos ósseos durante o período de consolidação da fratura. Até mesmo com a fixação rígida, uma adequada relação oclusal deve ser estabelecida antes da redução e fixação dos segmentos ósseos. As vantagens da técnica de fixação rígida no tratamento das fraturas mandibulares incluem a diminuição do desconforto e a possibilidade de retorno de todas funções mastigatórias normais no pós-operatório imediato.

38) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), marque a alternativa correta.

- A) O procedimento “ver, ouvir e sentir“ se há respiração é sempre o início do algoritmo.
- B) Grande ênfase nas compressões torácicas de alta qualidade. É aceitável, inclusive, que o leigo realize apenas as compressões (sem ventilação).
- C) O tradicional ABC foi substituído pelo BAC (Respiração, vias aéreas e massagem). Ou seja, o socorrista atuando sozinho deve iniciar a ressuscitação com 2 ventilações e 15 compressões cardíacas.
- D) A desfibrilação deve ser realizada após estabilização da circulação.



E) A ventilação é prioridade máxima no início da RCP, e esforços devem ser dirigidos para manter a oxigenação encefálica.

39) (CONCURSO MAURITI/2018) Achados como dificuldade respiratória, tontura, formigamento dos dedos dos pés, mãos ou lábios, dor torácica, xerostomia e alcalose são de;

- A) Angina
- B) Crise de Asma
- C) Hiperventilação
- D) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- E) Síndrome de Sjogren

40) (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o Tratamento do paciente com supressão suprarrenal que necessite de cirurgia oral menor, marque a alternativa correta.

- A) Instruir o paciente a dobrar a dose usual diária de corticoide no dia anterior e 6 dias após o procedimento
- B) Deve ser instituída hemodiálise 01 dia antes e 01 dia após o procedimento
- C) O paciente deve realizar betabloqueadores para a regulação simpática e evitar picos hipertensivos que comprometam o aparelho renal
- D) Após 12 dias de pós-operatório, o paciente pode suspender a dose excedente de corticoides.

E) Em geral os procedimentos menores só necessitam de controle de ansiedade.

41) (CONCURSO MAURITI/2018) Existe uma condição que soma achados clínicos de máculas pigmentadas, chamadas café com leite, geralmente unilaterais no tronco e coxa, displasia fibrosa poliostótica e precocidade sexual. Faz parte de qual síndrome?

- A) Síndrome de Apert
- B) Neurofibromatose
- C) Síndrome de Gorlin
- D) Síndrome de McCune-Albright
- E) Síndrome dos carcinomas nevoides basocelulares

42) (CONCURSO MAURITI/2018) Segundo a reportagem do dia 18 de Julho de 2018, no portal do ministério da saúde; “Até o dia 17 de julho, 444 casos foram confirmados de sarampo no Amazonas e 216 em Roraima. Todos estão relacionados à importação. O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira (18) as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação do sarampo no país. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. No entanto, os surtos estão relacionados à importação. Isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus (D8) que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela”.



Uma das formas de manifestação do sarampo na cavidade oral, e que pode levar o dentista a suspeitar do diagnóstico é um determinado sinal clínico. Marque abaixo qual é essa manifestação.

- A) Mancha de Koplick
- B) Mancha de Fordice
- C) Sinal de Quinn
- D) Úlcera persistente
- E) Mancha em alvo, vermelha com halo esbranquiçado

43- (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a instalação de implantes em mandíbulas atróficas, marque a opção correta;

- A) 4 implantes podem ser instalados com 2mm além do bordo inferior da mandíbula e 2mm supracrestal.
- B) 5 implantes devem ser instalados com a condição de não ultrapassar a cortical inferior da mandíbula
- C) 2 implantes com confecção de overdenture apresenta estabilidade inferior as demais técnicas de próteses fixas, porém o índice de falhas na osteointegração é bem menor.
- D) O enxerto ósseo não está indicado para altura óssea anterior com menos de 6mm
- E) Os implantes só podem ser instalados após 6 meses de enxertia óssea de mandíbulas atróficas.

44) (CONCURSO MAURITI/2018) Nas reconstruções com implantes ósseointegrados, temos que;

- A) A distância de 7mm do osso a área de contato das próteses promove 100% de chance de criar papila favorecendo pacientes com sorriso gengival
- B) A fíbula é um osso que suporta cargas e possui dimensão para reconstruir esteticamente e funcionalmente a mandíbula
- C) A perda óssea esperada com a colocação de implantes tem que ser de no máximo de 3 mm nos primeiros 12 a 18 meses
- D) Implantes com até 25 graus de inclinação podem evoluir com estabilidade
- E) Está contra-indicada reabilitação com implantes ósseointegrados para pacientes que se trataram de Câncer de cabeça e pescoço e realizaram quimioterapia

45) (CONCURSO MAURITI/2018) Tumor Odontogênico com achados histológicos de ilhas de cordões de epitélio odontogênico em um estroma colágeno denso, e sobre achados radiográficos mostra-se radiopaco e radiotransparente. Se trata de:

- A) Ceratocisto
- B) Odontoma composto
- C) Odontoma complexo
- D) Ameloblastoma
- E) Tumor de pindborg



46) (CONCURSO MAURITI/2018) Com relação às incisões realizadas na exodontia cirúrgica (ou aberta) avalie as afirmações:

- I – A base da incisão deve ser mais ampla que a margem livre (ápice);
- II – As incisões não podem ser realizadas na porção mais apical da gengiva marginal livre e também não podem ser realizadas na porção central das papilas interdentais;
- III – Ao fim do ato operatório o traço incisional deve estar apoiado em tecido ósseo sadio;

Marque a alternativa correta

- A) Apenas a afirmação II está correta;
- B) Apenas a afirmação III está correta;
- C) Apenas I e III estão corretas;
- D) Apenas I e II estão corretas;
- E) Todas estão corretas;

47) (CONCURSO MAURITI/2018) Os dentes incisivos laterais superiores que apresentam variações anatômicas, e devem ter os movimentos de luxação à fórceps;

- A) vestibular e levemente para palatino.
- B) mesio-distal.
- C) para palatino, somente
- D) palatino e levemente para vestibular

E) de rotação ao longo eixo do dente.

48) (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale a alternativa incorreta:

- A) A prevenção da pericoronarite é uma das principais indicações para a remoção de um dente incluso;
- B) A prevenção de formação de cistos e tumores odontogênicos é uma das indicações para a remoção de dentes inclusos;
- C) A remoção de dentes impactados é indicada para evitar a reabsorção de raízes de dentes adjacentes;
- D) Os dentes inclusos são aqueles que, chegada a época normal de erupção encontram-se no interior dos tecidos, circundados por tecido ósseo ou tecido ósseo e mucoso.
- E) A dor de origem indeterminada não tem nenhuma relação com a presença de dentes inclusos

49) (CONCURSO MAURITI/2018) Segundo a classificação de Winter e Pell & Gregory, para terceiros molares inferiores, o dente que apresentará um grau de maior dificuldade para sua remoção será o:

- A) Distoangular, classe II, posição C.
- B) Horizontal, classe II, posição C.
- C) Mesioangular, classe II, posição C.
- D) Vertical, classe I, posição A.



E) Mesioangular, classe II, posição B.

50) (CONCURSO MAURITI/2018) Qual das opções abaixo tem indicação formal para o uso de antibióticos em infecções odontogênicas?

- A) Envolvimento apenas de espaços faciais secundários
- B) Abscesso crônico bem localizado
- C) Pericoronarite branda
- D) Abscessos reduzidos localizados do lado vestibular
- E) Pulpite irreversível